

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 10-6-65 381000

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Abonnement : 15 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Supplément n°3 au bulletin n° 56

1965 - 15

- A V E R T I S S E M E N T S -

V I G N E

MILDIU :

Dans les foyers, les taches provenant des premiers repiquages sont apparues le premier juin après une durée d'incubation particulièrement longue due à la température basse de la dernière décade de Mai.

Actuellement, les foyers les plus nombreux sont situés dans le vignoble de raisin de table du Tarn et Garonne et du Lot. D'autres foyers bien plus rares sont également connus dans le Tarn (Gaillacois) et la Haute-Garonne (Frontonnais). Il est probable enfin que de nouveaux foyers primaires se sont établis à l'occasion des pluies des 17 et 18 Mai dans de nouveaux secteurs.

En conséquence, la vigne se trouvant en ce moment en période de grande sensibilité, un traitement général est recommandé d'autant plus que le temps demeure toujours très incertain.

BLACK-ROT :

Le traitement conseillé ci-dessus permettra de combattre également le Black-rot.

ARBRES FRUITIERS

Pyrale du poirier :

Les larves de seconde génération commencent à éclore depuis quelques jours. Dans les vergers fortement attaqués l'année précédente, surveiller attentivement les arbres et intervenir le cas échéant dans les prochains jours.

Carpocapse et Tavelures :

Nous rappelons les termes de notre bulletin précédent.

CULTURES LEGUMIERES

POMMES DE TERRE :

Doryphore :

Combattre cet insecte dès que les jeunes larves atteignent la grosseur d'un grain de blé.

Mildiou :

Les premières taches sont apparues au cours de ces derniers jours, en particulier dans les cultures de primeurs des secteurs maraîchers. Poursuivre la protection dans ces cultures et traiter également les plantations de plein champ, notamment lorsqu'elles couvrent le sol.

Betteraves rouges :

Contre la Cercosporiose (petites taches arrondies, claires, ...)

P 63

auréolées de rouge) très fréquente actuellement dans certaines cultures, appliquer un traitement d'un produit fongicide à base, soit de cuivre : Oxychlorure, sulfate basique, oxyde cuivreux, soit d'un organo-cuprique du type Zinèbe-cuivre.

REMARQUE

Renouvellement automatique d'un traitement après une forte pluie.

Lorsqu'une chute de pluie supérieure à 20 - 25 millimètres se produit, il y a lieu de considérer que les produits épandus sont à peu près complètement entraînés.

TOULOUSE le 2 JUIN 1965

les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux

L. IMBERT